

Diarrheel SN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: Diarrheel SN Comprimidos. **2. COMPOSICIÓN: Comprimidos:** 1 comprimido contiene: Argentum nitricum D8, Acidum arsenicosum D8, Colchicum D6, Colocynthis D6, Hydrargyrum bichloratum D8, Podophyllum D6, Veratrum D4 ana 30 mg; Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. **3. FORMAS FARMACÉUTICAS:** Diarrheel SN Comprimidos. **4. DATOS CLÍNICOS:** **4.1. Indicaciones terapéuticas:** Medicamento tradicionalmente utilizado en diarreas agudas y crónicas, gastroenteritis. **4.2. Posología y forma de administración:** Diarrheel SN Comprimidos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). **4.3. Contraindicaciones:** Embarazo. **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Advertencia especial: en presencia de enfermedades que cursen con diarrea, sobre todo en los niños, la medida terapéutica más importante debe ser la reposición de líquidos y electrolitos. En caso de diarrea en lactantes y niños pequeños, consulte a su médico. Los adultos que presenten diarrea durante más de 2 días o diarrea acompañada de deposiciones sanguinolentas o aumento de la temperatura también deberán acudir al médico, al igual que los que tengan diarrea recurrente. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. **4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No se han descrito. **4.6. Embarazo y lactancia:** Contraindicado en embarazo. **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** Este medicamento no afecta a la capacidad de conducir ni a la utilización de maquinaria. **4.8. Reacciones adversas:** Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso debe interrumpirse la administración del medicamento. El principio activo homeopático cloruro mercuríco (mercurio) puede provocar reacciones alérgicas y salivación excesiva. En tal caso, hay que interrumpir la administración y acudir a un médico. **4.9. Sobredosis:** Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:** Medicamento homeopático. **6. DATOS FARMACÉUTICOS:** **6.1. Incompatibilidades:** No se han descrito. **6.2. Periodo de validez:** 5 años. **6.3. Precauciones especiales de conservación:** No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar protegido de la luz y de la humedad. Mantener el envase perfectamente cerrado. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **6.4. Naturaleza y contenido del envase:** Diarrheel SN Comprimidos: Envase con 50 comprimidos de 301,5 mg. **6.5. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** Para su eliminación debe utilizarse el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico (SIGRE). **6.6. Presentaciones y PVP (IVA):** Diarrheel SN Comprimidos envase con 50 comprimidos: 14,91 €. **6.7. Condiciones de dispensación:** Sin receta médica, no reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Laboratorios Heel España S.A.U. Polígono La Mina, Madroño s/n. 28770 Colmenar Viejo (Madrid). **8. AUTORIZACIÓN:** Este medicamento se comercializa de acuerdo a lo

establecido en la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007. **9.**
TEXTO REVISADO: 21/03/11. Información reservada a profesionales sanitarios.