



068130/5002 GP ES

# Diarrheel SN

## Comprimidos

Medicamento homeopático

**Composición:** 1 comprimido contiene: Argentum nitricum D8, Acidum arsenicosum D8, Colchicum D6, Colocynthis D6, Hydrargyrum bichloratum D8, Podophyllum D6, Veratrum D4 ana 30 mg. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Forma farmacéutica y contenido del envase:** Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

**Titular:**

Laboratorios Heel España, S.A.U.  
C/Madroño, s/n.  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

**Fabricante:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden-Baden, Alemania

**Indicaciones terapéuticas:** Medicamento tradicionalmente utilizado en diarreas agudas y crónicas, gastroenteritis.

**Contraindicaciones:** Embarazo.

**Precauciones:** No se han descrito.

**Interacciones:** No se han descrito.

**Advertencias:** No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Advertencia especial: en presencia de enfermedades que cursen con diarrea, sobre todo en los niños, la medida terapéutica más importante debe ser la reposición de líquidos y electrolitos. En caso de diarrea en lactantes y niños pequeños, consulte a su médico. Los adultos que presenten diarrea durante más de 2 días o diarrea acompañada de deposiciones sanguinolentas o aumento de la temperatura también deberán acudir al médico, al igual que los que tengan diarrea recurrente.

## -Heel



Auflage: 5002

Code: 1314

Format: 105 x 148 mm

Pt. 432

Nochmals Korrekturabzug \_

Druckreif ohne Korrektur \_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_



Advertencia sobre excipientes: este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.




**Posología:** Vía oral. En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

**Reacciones adversas:** Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso debe interrumpirse la administración del medicamento. Si se observa cualquier reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**



Nochmals Korrekturabzug \_

Druckreif ohne Korrektur \_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_