



068134/5003 GP ES

Gastricumeel

Comprimidos

Medicamento homeopático

Composición: 1 comprimido contiene: Argentum nitricum D6, Acidum arsenicosum D6 ana 30 mg; Pulsatilla D4, Nux vomica D4, Carbo vegetabilis D6, Antimonium crudum D6 ana 60 mg. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Indicaciones terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo.

Contraindicaciones: No se han descrito.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Advertencia especial: Deberá acudir al médico en caso de presentar síntomas prolongados, difusos o de nueva aparición, ya que puede tratarse de una enfermedad que requiera un diagnóstico y tratamiento médico. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Auflage: 5003

Code: 1265

Format: 105 x 148 mm

Pt. 432

-Heel



Nochmals Korrekturabzug _

Druckreif ohne Korrektur _

Datum/Unterschrift



Posología: Vía oral. En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).




Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.



Nochmals Korrekturabzug _

Druckreif ohne Korrektur _

Datum/Unterschrift _____