



Gripp-Heel

Comprimidos

Medicamento homeopático

Composición: 1 comprimido contiene: Aconitum D4 120 mg; Bryonia D4, Lachesis D12 ana 60 mg; Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D5 ana 30 mg. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: No se han descrito.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Advertencia especial: En caso de molestias prolongadas, disnea, expectoración purulenta, fiebre o dolores debidos a la respiración, debería consultarse a un médico. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Posología: Vía oral. En general, 1 comprimido 3-5 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

068135/5002 GP

ES

Mat.no.: 068135

Version: 5002

Code: 16

Size: 105 x 148 mm

Flm: –

Type size: 7 Punkt

Colours: ■ Pantone 432

1. Proof __12.02.2013__

2. Proof __15.03.2013__

3. Proof __18.03.2013__

 Correction necessary **Approved for printing** Valid until _____ Valid until further note

Date/Signature

-Heel


-Heel




Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.



Reacciones adversas: No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase. Una vez abierto el envase caduca a los 12 meses.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

