

068147/5003 GP ES




Spascupreel

**Comprimidos**

Medicamento homeopático

Composición: 1 comprimido contiene: Colocynthis D4, Ammonium bromatum D4, Atropinum sulfuricum D6, Veratrum D6, Magnesium phosphoricum D6, Gelsemium D6 ana 30 mg; Passiflora incarnata D2, Agaricus D4, Chamomilla D3, Cuprum sulfuricum D6 ana 15 mg; Aconitum D6 60 mg. 1 comprimido contiene aprox. 300 mg de lactosa. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania


Indicaciones Terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en espasmos de musculatura lisa (estómago, intestino, vesícula biliar, útero y vías urinarias) y estriada (miogelosis, endurecimiento muscular).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a Chamomilla o a las plantas de la familia de las Compuestas.


Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.


Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.



-Heel

Nochmals Korrekturabzug Druckreif ohne Korrektur

Datum/Unterschrift _____




Posología: Vía oral. En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: En casos raros pueden ocurrir reacciones alérgicas cutáneas. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Nochmals Korrekturabzug

—

Druckreif ohne Korrektur

—

Datum/Unterschrift