

068109/5003 GP ES

# Tartephedreel N

## Gotas orales en solución

Medicamento homeopático

**Composición:** 100 g contienen: Tartarus stibiatus D4, Belladonna D4, Natrium sulfuricum D4, Arsenum jodatum D6 ana 10 g; Naphthalinum D6, Anisum stellatum D3, Lobelia inflata D4, Ipecacuanha D4, Blatta orientalis D6 ana 5 g. Excipiente: etanol 35% V/V. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Forma farmacéutica y contenido del envase:** Envase cuentagotas conteniendo 30 ml o 100 ml de gotas orales en solución.

**Titular:**

Laboratorios Heel España, S.A.U.  
C/Madroño, s/n.  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

**Fabricante:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden-Baden, Alemania

**Indicaciones terapéuticas:** Medicamento tradicionalmente utilizado en bronquitis, especialmente de naturaleza asmática, asma bronquial, tos con expectoración difícil. Tos persistente en niños escrofulósicos, catarro bronquial, catarro laringeo de tipo diverso, ciertas formas de tos ferina. Este medicamento está indicado en todas las afecciones catarrales de las vías respiratorias.

**Contraindicaciones:** En caso de afecciones de tiroides, no utilizar sin consultar al médico.

**Precauciones:** No se han descrito.

**Interacciones:** No se han descrito.

Auflage: 5003

Code: 1291

Format: 105 x 148 mm


Pt. 432

# -Heel

Nochmals Korrekturabzug \_

Druckreif ohne Korrektur \_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_



**Advertencias:** No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. Advertencias sobre excipientes: este medicamento contiene 35% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 140 mg/10 gotas, lo que equivale a 2,8 ml de cerveza o 1,2 ml de vino. Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.


**Posología:** Vía oral. En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

**Reacciones adversas:** No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**



Nochmals Korrekturabzug \_\_\_\_\_

Druckreif ohne Korrektur \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift