



068110/5002 GP ES



# Traumeel<sub>s</sub>

**Gotas orales en solución**

Medicamento homeopático

**Composición:** 100 g contienen: Atropa belladonna D4 25 g; Aconitum napellus D3 10 g; Symphytum officinale D8 8 g; Calendula officinalis D2 5 g; Hamamelis virginiana D2 5 g; Achillea millefolium D3 5 g; Chamomilla recutita D3 8 g; Echinacea angustifolia D2 2 g; Echinacea purpurea D2 2 g; Hypericum perforatum D2 1 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D8 10 g; Hepar sulfuris D8 10 g; Bellis perennis D2 2 g; Arnica montana D2 5 g. Excipiente: Etanol 35 % V/V. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Forma farmacéutica y contenido del envase:** Envase cuentagotas de 30 ml o 100 ml de gotas orales en solución.

**Titular:**

Laboratorios Heel España, S.A.U.  
C/Madroño, s/n.  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

**Fabricante:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden-Baden, Alemania

**Indicaciones Terapéuticas:** Medicamento tradicionalmente utilizado en procesos inflamatorios y procesos degenerativos con inflamación asociada a diversos órganos y tejidos, incluyendo los que afectan al sistema musculoesquelético.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguno de los principios activos o excipientes, al Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium o a otras plantas de la familia de las compuestas. En principio, Echinacea no debe utilizarse en enfermedades sistémicas progresivas, como tuberculosis, leucemia o patologías relacionadas con la leucemia, enfermedades inflamatorias del tejido conectivo (afecciones del colágeno), enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, SIDA, infección por VIH y otras enfermedades víricas crónicas.

**Precauciones:** No se han descrito.

**Interacciones:** No se han descrito.

## -Heel



Auflage: 5002

Code: 1270

Format: 105 x 148 mm


Druckfarben:

Schwarz = Pantone 432

Nochmals Korrekturabzug

Druckreif ohne Korrektur

Datum/Unterschrift



**Advertencias:** No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene 35% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 410 mg/ 30 gotas, lo que equivale a 8,2 ml de cerveza o 3,4 ml de vino. Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en período de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.


**Posología:** Vía oral. En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de edema de partes blandas, 30 gotas 3 veces al día.

**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

**Reacciones adversas:** En casos individuales pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas cutáneas (enrojecimiento, hinchazón y picor) en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las compuestas (por ejemplo Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium). En estos casos se deberá interrumpir la administración del medicamento. Tras el tratamiento con medicamentos que contienen extractos de Echinacea, se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial. Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso también debe interrumpirse la administración del medicamento. El principio activo homeopático Mercurius solubilis puede desencadenar ocasionalmente reacciones alérgicas. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. Envase bien cerrado. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.



Nochmals Korrekturabzug \_

Druckreif ohne Korrektur \_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_