

Zeel T

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO. Zeel T Comprimidos. Zeel T Pomada. Zeel T Solución Inyectable. **2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.** **Comprimidos:** 1 comprimido contiene las siguientes sustancias activas: Cartilago suis D 4, Funiculus umbilicalis suis D 4, Embryo suis D 4, Placenta suis D 4 ana 0,30 mg; Rhus toxicodendron D 2 0,54 mg; Arnica montana D 1 0,60 mg; Solanum dulcamara D 2, Symphytum D 8 ana 0,15 mg; Sanguinaria canadensis D 3 0,45 mg, Sulfur D 6 0,54 mg; Nadidum D 6, Coenzima A D 6, Acidum α -liponicum D 6, Natrium oxalaceticum D 6 ana 0,03 mg; Acidum silicicum D 6 3,00 mg. Excipiente(s) con efecto conocido: Estearato de magnesio, lactosa. **Pomada.** 100 g contienen las siguientes sustancias activas: Cartilago suis D 2, Funiculus umbilicalis suis D 2, Embryo suis D 2, Placenta suis D 2 ana 0,001 g; Rhus toxicodendron D 2 0,27 g; Arnica montana D 2 0,3 g; Solanum dulcamara D 2 0,075 g; Symphytum D 8 0,75 g; Sanguinaria canadensis D 2 0,225 g; Sulfur D 6 0,270 g; Nadidum D 6, Coenzima A D 6, Acidum α -liponicum D 6, Natrium oxalaceticum D 6 ana 0,01 g; Acidum silicicum D 6 1,0 g. Excipiente(s) con efecto conocido: agua purificada, etanol, parafina líquida, parafina sólida, alcohol cetosteárico, emulsificante. Contenido en etanol. 12,9% V/V. **Solución inyectable.** 1 ampolla contiene las siguientes sustancias activas: Cartilago suis D 6, Funiculus umbilicalis suis D 6, Embryo suis D 6, Placenta suis D 6 ana 2,0 mg; Solanum dulcamara D 3, Symphytum D 6 ana 10,0 mg; Nadidum D 8, Coenzima A D 8 ana 2,0 mg; Sanguinaria canadensis D 4 3,0 mg; Natrium oxalaceticum D 8, Acidum α -liponicum D 8 ana 2,0 mg; Rhus toxicodendron D 2 10,0 mg; Arnica montana D 4 200 mg; Sulfur D 6 3,6 mg. Excipiente(s) con efecto conocido: Agua para inyectables, cloruro de sodio. **3. FORMAS FARMACÉUTICAS.** Zeel T Comprimidos. Zeel T Pomada. Zeel T Solución Inyectable. **4. DATOS CLÍNICOS.** **4.1. Indicaciones terapéuticas.** Medicamento tradicionalmente utilizado en artrosis (particularmente gonartrosis), poliartrosis, espondiloartrosis, periartritis escapulo humeral. **4.2 Posología y forma de administración.** Zeel T Comprimidos: En general, 1 comprimido 3-5 veces al día, dejándolo disolver en la boca. Zeel T Pomada: En general, aplicar en la zona afectada, por la mañana y por la noche, utilizando una cantidad de pomada proporcional a dicha zona (por ejemplo, unos 4 o 5 cm para la zona de la rodilla) y extendiéndola dando un masaje suave. Zeel T Solución inyectable: En general, 1 ampolla (o 2 ampollas en caso de articulaciones grandes) 2 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v., periarticular o, en caso necesario, paravertebral. **4.3. Contraindicaciones.** Comprimidos y Solución inyectable. Hipersensibilidad a la hiedra venenosa o al árnica. Al contener Sanguinaria no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia. Pomada. Hipersensibilidad al árnica, a la hiedra venenosa o constituyentes de la base de la pomada. Embarazo y lactancia. **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo.** Comprimido: En caso de administración durante más de 4 semanas deben controlarse los valores de la función hepática. Advertencia sobre excipientes. Comprimidos: Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Pomada: Este medicamento puede producir reacciones locales

en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetorestearílico. **4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción.** No se han descrito. **4.6. Embarazo y lactancia.** Contraindicado en embarazo y lactancia. **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.** Este medicamento no afecta a la capacidad de conducir ni en la utilización de maquinaria. **4.8. Reacciones adversas.** Comprimidos: Durante el tratamiento con medicamentos que contienen alcaloides de Sanguinaria se ha observado, en casos aislados un aumento de los valores de la función hepática (transaminasas) y de la bilirrubina sérica hasta llegar a una ictericia inducida por el medicamento (hepatitis tóxica medicamentosa) que se normalizó o remitió tras interrumpir la administración del medicamento. En casos aislados pueden aparecer molestias gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso después de varios días tras la administración. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad en casos aislados en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las compuestas (árnica). Pomada: En casos aislados, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas cutáneas. Solución inyectable. En casos individuales es posible que personas cuya hipersensibilidad a compuestas (Arnica) es conocida presenten reacciones de hipersensibilidad (hasta la reacción anafiláctica). Pueden aparecer en el punto de pinchazo rubefacción, tumefacción y dolores transitorios. En casos aislados pueden aparecer molestias gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso después de varios días tras la administración. **4.9. Sobredosis.** Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.** Medicamento homeopático. **6. DATOS FARMACÉUTICOS.** **6.1. Incompatibilidades.** No se han descrito. **6.2. Periodo de validez.** Comprimidos y Solución inyectable: La vida útil de este medicamento es de 5 años. Pomada: La vida útil de este medicamento es de 3 años. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **6.3. Precauciones especiales de conservación.** No conservar a temperatura superior a 30 °C. Conservar protegido de la luz y de la humedad. Mantener el envase perfectamente cerrado. **6.4. Naturaleza y contenido del envase.** Zeel T Comprimidos: Envase de 50 comprimidos de 301,5 mg. Zeel T Pomada: Tubo de pomada de 50 g. Zeel T Solución inyectable: Envase de 5 ó 50 ampollas de vidrio de 2 ml. **6.5. Precauciones especiales de eliminación del medicamento.** Para su eliminación debe utilizarse el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico (SIGRE). **6.6. Presentaciones y PVP (IVA).** Zeel T Comprimidos envase con 50 comprimidos: 13,90 €; Zeel T Pomada tubo de 50 g: 13,41 €; Zeel T Solución Inyectable envase de 5 ampollas de 2 ml: 16,70 €; Zeel T Solución Inyectable envase de 50 ampollas de 2 ml: 124,00 €. **6.7. Condiciones de dispensación.** Sin receta médica, no reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.** Laboratorios Heel España S.A.U. Polígono La Mina, Madroño s/n-28770 Colmenar Viejo-Madrid. **8. AUTORIZACIÓN.** Este medicamento se comercializa de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007. **9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.** Enero 2013. Información reservada a profesionales sanitarios.