

## Oculoheel

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO:** Oculoheel Colirio en solución. Oculoheel Comprimidos. **2. COMPOSICIÓN:** **Colirio en solución:** 1 monodosis contiene: Euphrasia officinalis D 5, Cochlearia officinalis D 5, Pilocarpus jaborandi D 5, Echinacea angustifolia D 5 ana 110,7 mg. Excipientes: Cloruro de sodio, dihidrogenofosfato de sodio dihidrato, hidrogenofosfato de sodio dihidrato. **Comprimidos:** 1 comprimido contiene: Apis mellifica D 4, Natrium chloratum D 6 ana 30 mg; Rhus toxicodendron D 12, Hepar sulfuris D 12, Spigelia anthelmia D 6 ana 60 mg; Staphisagria D 4 45 mg; Aethiops mineralis D 8 15 mg. Excipientes: Estearato de magnesio, lactosa. **3. FORMAS FARMACÉUTICAS:** Oculoheel Colirio en solución. Oculoheel Comprimidos. **4. DATOS CLÍNICOS:** **4.1. Indicaciones terapéuticas:** Oculoheel Colirio en solución: Medicamento tradicionalmente utilizado en irritaciones e inflamaciones de la conjuntiva y del borde del párpado debido a estímulos externos, esfuerzo excesivo o reacciones alérgicas; ojos secos. Oculoheel Comprimidos: Medicamento tradicionalmente utilizado en conjuntivitis, blefaritis, dacriocistitis (especialmente formas crónicas). **4.2. Posología y forma de administración:** Oculoheel colirio en solución: En general, instilar 1 gota en el ojo afectado, 3 veces al día, o más veces en caso necesario. El contenido de un envase unidosis es suficiente para la aplicación en ambos ojos. Cada vez que haya que administrar este colirio, se ha de abrir un nuevo envase unidosis. Oculoheel comprimidos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). **4.3. Contraindicaciones:** Colirio en solución: Hipersensibilidad a alguno de los principios activos, a los excipientes o a las plantas de la familia de las Compuestas. Comprimidos: No se han descrito. **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Advertencia sobre excipientes: Comprimidos: este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. **4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No se han descrito. **4.6. Embarazo y lactancia:** No se dispone de datos clínicos de este medicamento en el embarazo y la lactancia. No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Hasta la fecha no se han notificado efectos adversos. **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** Este medicamento no afecta a la capacidad de conducir ni a la utilización de maquinaria. **4.8. Reacciones adversas.** Colirio en solución: En casos raros pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad. Se han notificado reacciones alérgicas locales (inflamación cutánea). Comprimidos: No se han descrito. **4.9. Sobredosis:** Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:** Medicamento homeopático. **6. DATOS FARMACÉUTICOS:** **6.1. Incompatibilidades:** No se han descrito. **6.2. Periodo de validez:** Colirio: 2 años. Comprimidos: 5 años. **6.3. Precauciones especiales de conservación:** No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar protegido de la humedad. Mantener el envase perfectamente

cerrado. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **6.4. Naturaleza y contenido del envase:** Oculoheel Colirio en solución: Envase con 15 monodosis de 0,45 ml de colirio en solución. Oculoheel comprimidos: Envase con 50 comprimidos de 301,5 mg. **6.5. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** Para su eliminación debe utilizarse el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico (SIGRE). **6.6. Presentaciones y PVP (IVA):** Oculoheel Colirio en solución envase con 15 monodosis de 0,45 ml: 9,21 €; Oculoheel Comprimidos envase con 50 comprimidos: 14,91 €. **6.7. Condiciones de Dispensación:** Sin receta médica, no reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Laboratorios Heel España S.A.U. Polígono La Mina, Madroño s/n. 28770 Colmenar Viejo (Madrid). **8. AUTORIZACIÓN:** Este medicamento se comercializa de acuerdo a lo establecido en la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007. **9. TEXTO REVISADO:** 03/01/11. Información reservada a profesionales sanitarios.